

尾 鷲 湾 水 質 速 報

発行年月日
観測年月日

令和7年1月15日
令和7年1月15日

No. 25-002
尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古 里 養 殖 場	9:15	24	0	17.8	33.8	7.2	92.1	14.0		
			2	17.8	33.8	7.2	92.5			
			5	17.9	33.8	7.2	93.2			
			10	17.8	33.8	7.1	91.6			
			B-1	17.8	33.8	7.0	90.2			
尾 南 曾 鼻	9:39	-	0	18.2	33.9	7.3	94.7	19.0		
			2	18.2	33.9	7.3	95.2			
			5	18.2	33.9	7.3	95.2			
			10	18.2	33.9	7.3	95.1			
			20	18.2	33.9	7.3	94.7			
須 賀 利 養 殖 場	9:46	44	0	18.1	33.9	7.2	93.1	16.0		
			2	18.1	33.9	7.1	92.5			
			5	18.1	33.9	7.1	92.1			
			10	18.1	33.9	7.1	91.7			
			B-1	18.0	33.9	6.8	87.9			
行 野 浦 養 殖 場	10:16	15	0	16.3	33.3	7.4	92.2	11.0		
			2	16.5	33.3	7.4	93.0			
			5	16.9	33.5	7.4	93.7			
			10	17.8	33.8	7.3	94.5			
			B-1	17.7	33.8	7.3	93.9			
大 曾 根 養 殖 場	10:24	27	0	17.2	33.6	7.3	93.4	12.0		
			2	17.2	33.6	7.3	93.0			
			5	17.2	33.6	7.3	92.6			
			10	17.4	33.7	7.2	91.9			
			B-1	17.8	33.8	7.2	93.0			
湾 中 央 部	9:24	35	0	17.5	33.7	7.3	94.0	15.0		
			2	17.6	33.7	7.4	95.3			
			5	17.6	33.7	7.5	95.6			
			10	17.7	33.8	7.4	95.7			
			B-1	17.3	33.7	7.2	92.2			
最 大 値				18.2	33.9	7.5	95.7	19.0		
最 小 値				16.3	33.3	6.8	87.9	11.0		

概 況

水温は16.3～18.2℃の範囲にあり、湾内の表層付近では概ね17.6℃前後の値となっていた。これは、過去30年間の2m層における平年値と比較すると+1.7℃～+2.4℃であり平年より高めの値を示した。

塩分濃度は33.3～33.9psuの範囲であった。

溶存酸素量(DO)は6.8～7.5mg/lの範囲であった。

透明度は11.0m～19.0mの範囲であった。

尾 鷲 湾 水 質 速 報

発行年月日
観測年月日

令和7年2月19日
令和7年2月19日

No. 25-004
尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古 里 養 殖 場	9:06	24	0	14.9	33.9	8.4	102.4	13.0		
			2	14.9	33.9	8.2	99.4			
			5	14.9	33.9	8.1	98.1			
			10	14.9	33.9	8.0	97.8			
			B-1	14.9	33.9	8.0	96.9			
尾 南 曾 鼻	9:33	-	0	15.3	33.9	7.9	97.2	23.0		
			2	15.3	34.0	7.8	95.3			
			5	15.3	34.0	7.5	92.6			
			10	15.4	34.0	7.4	90.6			
			20	15.3	34.0	7.3	89.9			
須 賀 利 養 殖 場	9:45	42	0	15.2	34.0	7.5	92.1	19.0		
			2	15.2	34.0	7.3	89.8			
			5	15.2	34.0	7.2	88.7			
			10	15.2	34.0	7.3	89.3			
			B-1	15.2	34.0	7.0	85.8			
行 野 浦 養 殖 場	10:13	14	0	14.4	33.8	8.7	104.9	7.0		
			2	14.4	33.8	8.7	104.9			
			5	14.4	33.8	8.7	104.9			
			10	14.4	33.8	8.7	104.8			
			B-1	14.2	33.8	8.8	105.1			
大 曾 根 養 殖 場	10:21	26	0	14.9	33.9	8.5	103.1	9.0		
			2	14.9	33.9	8.4	102.5			
			5	14.9	33.9	8.4	102.1			
			10	14.8	33.9	8.4	101.6			
			B-1	14.5	33.8	8.3	100.1			
湾 中 央 部	9:16	34	0	14.7	33.9	8.6	103.7	13.0		
			2	14.8	33.9	8.4	101.9			
			5	14.8	33.9	8.3	101.4			
			10	14.8	33.9	8.3	100.9			
			B-1	14.8	33.9	8.2	99.3			
最 大 値				15.4	34.0	8.8	105.1	23.0		
最 小 値				14.2	33.8	7.0	85.8	7.0		

概 況

水温は14.2～15.4℃の範囲にあり、湾内の表層付近では概ね14.9℃前後の値となっていた。これは、過去30年間の2m層における平年値と比較すると-0.2℃～+0.1℃であり平年並みの値を示した。

塩分濃度は33.8～34.0psuの範囲であった。

溶存酸素量(DO)は7.0～8.8mg/lの範囲であった。

透明度は7.0m～23.0mの範囲であった。

尾 鷲 湾 水 質 速 報

発行年月日
観測年月日

令和7年3月11日
令和7年3月11日

No. 25-005
尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古 里 養 殖 場	9:03	24	0	16.4	34.0	7.4	92.5	8.0		
			2	16.5	34.0	7.3	91.7			
			5	16.6	34.1	7.3	91.5			
			10	16.7	34.1	7.4	93.8			
			B-1	16.6	34.1	7.3	92.0			
尾 南 曾 鼻	9:29	-	0	16.5	34.1	7.7	96.9	14.0		
			2	16.5	34.1	7.7	97.2			
			5	16.6	34.1	7.7	97.1			
			10	16.5	34.1	7.7	96.6			
			20	16.5	34.1	7.6	96.2			
須 賀 利 養 殖 場	9:38	43	0	16.5	34.0	7.7	96.3	13.0		
			2	16.6	34.1	7.6	96.4			
			5	16.6	34.1	7.6	95.6			
			10	16.6	34.1	7.6	95.2			
			B-1	16.5	34.1	7.2	90.7			
行 野 浦 養 殖 場	10:09	15	0	16.0	33.6	7.8	96.5	8.0		
			2	16.0	33.7	7.8	96.5			
			5	16.2	33.9	7.7	96.1			
			10	16.4	34.0	7.3	91.9			
			B-1	16.3	34.0	7.4	92.5			
大 曾 根 養 殖 場	10:17	26	0	16.2	33.7	7.6	95.0	8.0		
			2	16.2	33.8	7.6	94.8			
			5	16.4	34.0	7.2	90.5			
			10	16.5	34.1	7.3	91.2			
			B-1	16.6	34.1	7.2	91.0			
湾 中 央 部	9:13	35	0	16.0	33.7	7.8	96.5	10.0		
			2	16.2	33.9	7.8	97.5			
			5	16.5	34.0	7.5	94.6			
			10	16.5	34.1	7.5	94.1			
			B-1	16.5	34.1	7.2	90.5			
最 大 値				16.7	34.1	7.8	97.5	14.0		
最 小 値				16.0	33.6	7.2	90.5	8.0		

概 況

水温は16.0～16.7℃の範囲にあり、湾内の表層付近では概ね16.3℃前後の値となっていた。これは、過去30年間の2m層における平年値と比較すると+0.6℃～+1.2℃であり平年より高めの値を示した。

塩分濃度は33.6～34.1psuの範囲であった。

溶存酸素量(DO)は7.2～7.8mg/lの範囲であった。

透明度は8.0m～14.0mの範囲であった。

尾 鷲 湾 水 質 速 報

発行年月日
観測年月日

令和7年4月14日
令和7年4月14日

尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古 里 養 殖 場	9:04	23	0	17.8	30.7	8.3	105.5	5.0		
			2	17.9	33.5	8.2	105.8			
			5	17.9	34.0	8.0	103.5			
			10	17.7	34.2	8.1	104.5			
			B-1	17.3	34.2	6.7	85.5			
尾 南 曾 鼻	9:31	-	0	17.4	33.0	8.2	104.6	9.0		
			2	17.4	33.7	8.1	103.5			
			5	17.4	34.0	7.9	101.0			
			10	17.3	34.0	7.9	100.6			
			20	17.1	34.2	7.8	99.0			
須 賀 利 養 殖 場	9:44	42	0	17.5	33.3	8.0	102.5	6.0		
			2	17.6	34.0	8.0	102.9			
			5	17.5	34.0	8.0	102.1			
			10	17.4	34.0	7.6	97.6			
			B-1	16.8	34.2	7.0	88.9			
行 野 浦 養 殖 場	10:14	15	0	17.2	30.8	8.0	99.9	5.0		
			2	17.6	33.3	8.0	102.7			
			5	17.6	33.8	8.2	105.4			
			10	17.6	34.0	7.9	101.9			
			B-1	17.6	34.1	7.8	99.6			
大 曾 根 養 殖 場	10:21	27	0	17.3	31.2	8.1	101.8	5.0		
			2	17.7	33.3	7.9	101.8			
			5	17.8	33.8	8.0	103.2			
			10	17.8	34.1	8.1	104.6			
			B-1	17.1	34.1	6.3	80.4			
湾 中 央 部	9:15	34	0	16.5	22.9	8.8	103.1	6.0		
			2	17.7	33.3	8.2	105.5			
			5	17.6	32.7	8.3	105.5			
			10	17.7	34.1	8.3	106.5			
			B-1	16.8	34.0	6.6	83.1			
最 大 値				17.9	34.2	8.8	106.5	9.0		
最 小 値				16.5	22.9	6.3	80.4	5.0		

概 況

水温は16.5～17.9℃の範囲にあり、湾内の表層付近では概ね17.7℃前後の値となっていた。これは、過去30年間の2m層における平年値と比較すると+0.8℃～+1.1℃であり平年より高めの値を示した。

塩分濃度は22.9～34.2psuの範囲であった。

溶存酸素量(DO)は6.3～8.8mg/lの範囲であった。

透明度は5.0m～9.0mの範囲であった。

尾 鷲 湾 水 質 速 報

発行年月日
観測年月日

令和7年5月12日
令和7年5月12日

尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古 里 養 殖 場	9:05	23	0	19.3	30.3	8.0	104.4	6.0		
			2	19.2	32.9	7.9	103.7			
			5	18.9	33.4	8.1	105.8			
			10	18.8	33.7	8.0	104.5			
			B-1	18.0	33.8	7.2	93.6			
尾 南 曾 鼻	9:31	-	0	19.1	29.4	8.0	103.3	13.0		
			2	19.0	33.1	7.9	103.0			
			5	19.0	33.5	7.9	103.4			
			10	18.9	33.7	7.8	102.9			
			20	18.2	33.8	7.8	101.6			
須 賀 利 養 殖 場	9:40	43	0	19.0	29.0	8.1	103.1	10.0		
			2	19.2	33.1	7.9	103.8			
			5	19.1	33.4	7.9	103.8			
			10	18.8	33.5	7.8	101.8			
			B-1	16.8	33.9	6.7	85.1			
行 野 浦 養 殖 場	10:11	14	0	19.0	24.9	8.5	106.0	7.0		
			2	19.5	32.1	8.1	107.2			
			5	19.1	33.2	8.1	106.4			
			10	18.9	33.6	7.9	103.6			
			B-1	18.6	33.7	7.6	99.6			
大 曾 根 養 殖 場	10:18	26	0	19.0	27.9	8.3	106.1	7.0		
			2	19.4	32.2	8.2	107.3			
			5	19.1	33.3	8.1	106.7			
			10	18.8	33.6	8.1	105.5			
			B-1	18.0	33.3	6.8	87.7			
湾 中 央 部	9:15	34	0	19.4	18.4	8.5	103.4	9.0		
			2	19.5	32.2	8.2	107.7			
			5	19.0	33.3	8.1	106.0			
			10	18.8	33.6	8.1	105.5			
			B-1	16.2	33.9	6.8	84.8			
最 大 値				19.5	33.9	8.5	107.7	13.0		
最 小 値				16.2	18.4	6.7	84.8	6.0		

概 況

水温は16.2～19.5℃の範囲にあり、湾内の表層付近では概ね19.3℃前後の値となっていた。これは、過去30年間の2m層における平年値と比較すると-0.2℃～-0.1℃であり平年並みの値を示した。

塩分濃度は18.4～33.9psuの範囲であった。

溶存酸素量(DO)は6.7～8.5mg/lの範囲であった。

透明度は6.0m～13.0mの範囲であった。

尾 鷲 湾 水 質 速 報

発行年月日
観測年月日

令和7年6月17日
令和7年6月17日

尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古 里 養 殖 場	9:09	24	0	23.8	27.6	7.8	107.9	6.0		
			2	22.4	32.0	7.7	106.5			
			5	21.9	32.3	7.8	107.7			
			10	21.4	32.7	7.8	107.1			
			B-1	20.2	33.4	6.0	81.2			
尾 南 曾 鼻	9:37	-	0	24.0	31.1	7.4	105.3	9.0		
			2	21.6	32.6	7.4	101.8			
			5	21.3	33.9	7.4	102.3			
			10	20.9	33.9	7.3	100.0			
			20	19.9	33.7	7.0	93.8			
須 賀 利 養 殖 場	9:46	46	0	23.8	30.7	7.3	102.3	8.0		
			2	22.1	32.3	7.3	101.0			
			5	21.7	32.6	7.4	101.8			
			10	21.2	32.0	7.4	99.8			
			B-1	19.7	33.9	6.7	89.7			
行 野 浦 養 殖 場	10:18	16	0	23.2	30.0	7.8	108.9	7.0		
			2	22.6	32.0	7.8	108.3			
			5	21.8	32.5	7.8	107.8			
			10	21.3	32.7	7.6	104.2			
			B-1	20.9	33.1	6.8	92.6			
大 曾 根 養 殖 場	10:26	28	0	24.1	30.9	7.7	108.8	6.0		
			2	22.3	31.4	8.1	111.2			
			5	21.7	32.4	8.0	110.0			
			10	21.2	32.9	7.4	101.1			
			B-1	20.1	33.5	5.2	69.7			
湾 中 央 部	9:22	35	0	25.2	21.8	8.0	109.5	6.0		
			2	23.4	31.5	7.9	111.6			
			5	21.8	32.5	8.0	109.7			
			10	21.4	32.8	7.7	105.7			
			B-1	19.7	33.2	6.2	83.0			
最 大 値				25.2	33.9	8.1	111.6	9.0		
最 小 値				19.7	21.8	5.2	69.7	6.0		

概 況

水温は19.7～25.2℃の範囲にあり、湾内の表層付近では概ね22.4℃前後の値となっていた。これは、過去30年間の2m層における平年値と比較すると0.4℃～1.5℃であり平年より高めの値を示した。

塩分濃度は21.8～33.9psuの範囲であった。

溶存酸素量(DO)は5.2～8.1mg/lの範囲であった。

透明度は6.0m～9.0mの範囲であった。

尾 鷲 湾 水 質 速 報

発行年月日
観測年月日

令和7年7月14日
令和7年7月14日

尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古 里 養 殖 場	9:08	24	0	27.6	29.1	6.9	102.2	8.0		
			2	27.6	31.3	6.8	102.9			
			5	27.4	32.0	6.3	95.5			
			10	27.3	32.1	6.2	93.6			
			B-1	21.6	32.5	6.2	85.0			
尾 南 曾 鼻	9:39	-	0	27.1	31.7	6.7	100.1	11.0		
			2	27.4	31.6	6.7	101.5			
			5	27.3	31.7	6.7	101.4			
			10	27.2	31.9	6.7	101.5			
			20	26.5	32.3	6.6	98.9			
須 賀 利 養 殖 場	9:46	40	0	27.4	31.8	6.4	96.6	12.0		
			2	27.4	31.9	6.4	95.9			
			5	27.3	32.0	6.2	92.8			
			10	27.2	32.1	5.9	89.4			
			B-1	21.3	33.6	6.6	90.5			
行 野 浦 養 殖 場	10:17	15	0	27.2	30.4	6.5	96.9	7.0		
			2	27.2	30.7	6.5	97.2			
			5	27.2	32.0	6.8	102.0			
			10	27.0	32.2	6.7	100.9			
			B-1	26.1	32.5	6.2	92.1			
大 曾 根 養 殖 場	10:25	27	0	27.4	31.2	6.6	99.3	7.0		
			2	27.3	31.5	6.3	95.3			
			5	27.2	31.7	6.1	92.3			
			10	27.1	32.0	6.2	92.6			
			B-1	23.6	33.1	6.0	84.8			
湾 中 央 部	9:20	35	0	27.3	30.8	6.7	100.1	11.0		
			2	27.4	31.7	6.8	101.8			
			5	27.3	32.0	6.7	101.7			
			10	27.2	32.1	6.7	101.1			
			B-1	20.8	33.7	6.5	88.6			
最 大 値				27.6	33.7	6.9	102.9	12.0		
最 小 値				20.8	29.1	5.9	84.8	7.0		

概 況

水温は20.8～27.6℃の範囲にあり、湾内の表層付近では概ね27.4℃前後の値となっていた。これは、過去30年間の2m層における平年値と比較すると2.7℃～3.3℃であり平年より高めの値を示した。

塩分濃度は29.1～33.7psuの範囲であった。

溶存酸素量(DO)は5.9～6.9mg/lの範囲であった。

透明度は7.0m～12.0mの範囲であった。

尾 鷲 湾 水 質 速 報

発行年月日
観測年月日

令和7年8月20日
令和7年8月20日

尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古 里 養 殖 場	9:01	23	0	25.4	32.6	8.1	118.3	11.0		
			2	24.0	33.2	7.3	104.7			
			5	22.6	33.5	7.0	97.7			
			10	21.0	33.7	7.4	100.8			
			B-1	18.8	34.0	5.2	67.7			
尾 南 曾 鼻	9:28	-	0	25.4	33.0	7.1	104.2	15.0		
			2	24.5	33.3	7.3	105.4			
			5	22.3	33.6	7.2	101.2			
			10	21.6	33.7	7.4	102.6			
			20	18.3	33.4	7.1	91.7			
須 賀 利 養 殖 場	9:37	41	0	24.7	33.4	7.0	101.4	10.0		
			2	24.1	33.5	7.0	101.3			
			5	22.3	33.6	7.0	97.4			
			10	20.4	34.1	7.2	98.1			
			B-1	16.9	34.0	5.6	70.6			
行 野 浦 養 殖 場	10:10	15	0	23.0	33.3	7.0	99.4	9.0		
			2	23.3	33.1	7.2	102.0			
			5	23.0	33.2	7.2	102.2			
			10	20.5	33.8	7.4	100.1			
			B-1	19.4	33.9	6.2	82.0			
大 曾 根 養 殖 場	10:18	26	0	25.9	32.2	6.9	101.4	9.0		
			2	24.0	33.1	7.0	100.3			
			5	22.3	33.5	7.3	101.4			
			10	20.7	33.7	7.3	99.5			
			B-1	18.3	34.0	5.0	65.1			
湾 中 央 部	9:12	34	0	25.4	32.6	7.1	103.7	11.0		
			2	24.2	33.3	7.4	106.6			
			5	22.6	33.5	7.2	101.5			
			10	21.1	33.7	7.5	102.1			
			B-1	17.3	34.0	5.3	68.1			
最 大 値				25.9	34.1	8.1	118.3	15.0		
最 小 値				16.9	32.2	5.0	65.1	9.0		

概 況

水温は16.9～25.9℃の範囲にあり、湾内の表層付近では概ね24.0℃前後の値となっていた。これは、過去30年間の2m層における平年値と比較すると-2.5℃～-2.8℃であり平年より低めの値を示した。

塩分濃度は32.2～34.1psuの範囲であった。

溶存酸素量(DO)は5.0～8.1mg/lの範囲であった。

透明度は9.0m～15.0mの範囲であった。

尾 鷲 湾 水 質 速 報

発行年月日
観測年月日

令和7年9月29日
令和7年9月29日

尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古 里 養 殖 場	9:06	24	0	25.2	32.2	7.2	104.3	6.0		
			2	25.4	32.8	6.0	88.1			
			5	25.5	33.0	5.7	83.6			
			10	25.4	33.1	5.6	82.9			
			B-1	24.6	33.3	5.4	79.0			
尾 南 曾 鼻	9:32	-	0	25.6	32.8	6.9	102.2	10.0		
			2	25.6	33.2	6.9	101.6			
			5	25.6	33.2	6.7	99.2			
			10	25.7	33.3	6.7	99.4			
			20	25.7	33.4	6.8	100.4			
須 賀 利 養 殖 場	9:41	44	0	25.5	33.1	6.1	89.7	9.0		
			2	25.5	33.1	6.0	88.7			
			5	25.5	33.1	6.0	89.0			
			10	25.5	33.2	6.0	88.4			
			B-1	21.7	33.8	6.0	82.6			
行 野 浦 養 殖 場	10:13	15	0	25.0	32.2	7.2	103.9	5.0		
			2	25.1	32.4	7.2	105.4			
			5	25.4	32.9	6.8	100.5			
			10	25.5	33.1	6.5	95.3			
			B-1	25.2	33.2	6.1	89.5			
大 曾 根 養 殖 場	10:20	26	0	25.3	33.4	6.9	101.8	6.0		
			2	25.4	32.8	6.8	100.3			
			5	25.4	33.0	6.4	93.3			
			10	25.4	33.1	6.3	93.1			
			B-1	24.7	33.3	5.6	81.9			
湾 中 央 部	9:15	34	0	25.2	32.3	7.4	108.4	6.0		
			2	25.4	32.7	7.4	109.2			
			5	25.6	33.0	6.8	100.4			
			10	25.5	33.2	6.7	99.3			
			B-1	21.9	33.7	5.5	76.4			
最 大 値				25.7	33.8	7.4	109.2	10.0		
最 小 値				21.7	32.2	5.4	76.4	5.0		

概 況

水温は21.7～25.7℃の範囲にあり、湾内の表層付近では概ね25.4℃前後の値となっていた。これは、過去30年間の2m層における平年値と比較すると-0.5℃～-0.9℃であり平年よりやや低めの値を示した。

塩分濃度は32.2～33.8psuの範囲であった。

溶存酸素量(DO)は5.4～7.4mg/lの範囲であった。

透明度は5.0m～10.0mの範囲であった。

尾 鷲 湾 水 質 速 報

発行年月日
観測年月日

令和7年10月21日
令和7年10月21日

尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古 里 養 殖 場	9:09	24	0	24.1	29.6	7.4	103.6	5.0		
			2	24.6	31.4	7.3	105.2			
			5	24.9	33.2	5.5	80.7			
			10	24.9	33.4	5.4	78.6			
			B-1	24.5	33.5	5.1	74.2			
尾 南 曾 鼻	9:34	-	0	24.3	33.3	6.7	97.2	12.0		
			2	24.3	33.3	6.8	97.5			
			5	24.3	33.3	6.7	97.4			
			10	24.3	33.3	6.7	97.1			
			20	24.3	33.3	6.7	96.4			
須 賀 利 養 殖 場	9:41	41	0	24.4	32.3	6.1	88.3	11.0		
			2	24.5	33.3	6.0	86.4			
			5	24.5	33.3	6.0	86.5			
			10	24.5	33.3	6.1	88.7			
			B-1	23.8	33.6	6.1	88.1			
行 野 浦 養 殖 場	10:12	14	0	23.2	29.4	7.3	101.3	5.0		
			2	23.2	29.7	7.3	101.9			
			5	24.5	33.1	6.5	94.1			
			10	24.8	33.4	6.3	91.8			
			B-1	24.8	33.4	6.0	87.9			
大 曾 根 養 殖 場	10:20	26	0	23.2	29.5	7.5	104.3	6.0		
			2	24.5	32.1	6.3	91.0			
			5	24.6	32.9	6.0	86.5			
			10	24.8	33.7	5.8	84.4			
			B-1	24.5	33.5	5.6	81.0			
湾 中 央 部	9:18	34	0	23.3	28.6	7.4	102.5	7.0		
			2	24.1	32.0	7.0	100.5			
			5	24.6	33.0	6.2	89.9			
			10	24.9	33.3	6.1	89.6			
			B-1	24.3	33.5	5.6	81.0			
最 大 値				24.9	33.7	7.5	105.2	12.0		
最 小 値				23.2	28.6	5.1	74.2	5.0		

概 況

水温は23.2～24.9℃の範囲にあり、湾内の表層付近では概ね24.2℃前後の値となっていた。これは、過去30年間の2m層における平年値と比較すると0.4℃～1.2℃であり平年より高めの値を示した。

塩分濃度は28.6～33.7psuの範囲であった。

溶存酸素量(DO)は5.1～7.5mg/lの範囲であった。

透明度は5.0m～12.0mの範囲であった。

尾 鷲 湾 水 質 速 報

発行年月日 令和7年11月26日
観測年月日 令和7年11月26日

尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古 里 養 殖 場	9:05	24	0	20.1	33.5	7.0	94.1	11.0		
			2	20.2	33.5	6.4	86.5			
			5	20.2	33.5	6.3	85.2			
			10	20.2	33.6	6.3	85.3			
			B-1	20.3	33.6	6.4	85.6			
尾 南 曾 鼻	9:30	-	0	20.5	33.7	7.0	95.0	6.0		
			2	20.5	33.7	7.2	96.9			
			5	20.5	33.7	7.2	97.2			
			10	20.5	33.7	7.2	96.8			
			20	20.5	33.7	7.1	96.1			
須 賀 利 養 殖 場	9:39	45	0	20.4	33.7	7.0	94.4	15.0		
			2	20.4	33.7	7.1	95.7			
			5	20.4	33.7	7.1	96.1			
			10	20.4	33.7	7.1	95.9			
			B-1	19.3	33.7	6.1	81.3			
行 野 浦 養 殖 場	10:10	16	0	19.7	33.3	6.9	91.6	8.0		
			2	19.7	33.3	6.8	90.9			
			5	19.6	33.3	6.8	90.3			
			10	19.6	33.3	6.8	90.2			
			B-1	19.4	33.3	6.7	89.1			
大 曾 根 養 殖 場	10:17	28	0	19.9	33.3	6.8	90.9	11.0		
			2	20.0	33.4	6.5	86.6			
			5	20.1	33.5	6.4	86.3			
			10	20.1	33.5	6.7	89.4			
			B-1	20.0	33.7	6.0	80.5			
湾 中 央 部	9:15	35	0	20.0	33.4	6.7	89.5	13.0		
			2	20.0	33.4	6.7	89.7			
			5	20.0	33.4	6.7	89.9			
			10	20.0	33.5	6.7	90.0			
			B-1	19.5	33.7	5.6	74.7			
最 大 値				20.5	33.7	7.2	97.2	15.0		
最 小 値				19.3	33.3	5.6	74.7	6.0		

概 況

水温は19.3～20.5℃の範囲にあり、湾内の表層付近では概ね20.1℃前後の値となっていた。これは、過去30年間の2m層における平年値と比較すると-0.4℃～-1.1℃であり平年より低めの値を示した。

塩分濃度は33.3～33.7psuの範囲であった。

溶存酸素量(DO)は5.6～7.2mg/lの範囲であった。

透明度は6.0m～15.0mの範囲であった。

尾 鷲 湾 水 質 速 報

発行年月日
観測年月日

令和7年12月10日
令和7年12月10日

尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古 里 養 殖 場	9:12	24	0	18.1	34.4	6.7	87.7	10.0		
			2	18.1	34.4	6.6	86.2			
			5	18.1	34.4	6.5	85.1			
			10	18.2	34.5	6.5	84.1			
			B-1	18.2	34.5	6.4	83.3			
尾 南 曾 鼻	9:37	-	0	18.4	34.5	7.3	95.5	17.0		
			2	18.4	34.5	7.3	95.0			
			5	18.4	34.5	7.2	94.8			
			10	18.4	34.6	7.2	94.2			
			20	18.4	34.6	7.2	93.8			
須 賀 利 養 殖 場	9:45	45	0	18.7	34.6	7.5	99.1	12.0		
			2	18.2	34.5	7.5	97.1			
			5	18.2	34.5	7.4	96.9			
			10	18.2	34.5	7.4	96.5			
			B-1	18.0	34.5	6.7	87.5			
行 野 浦 養 殖 場	10:16	16	0	17.6	34.1	7.5	96.8	7.0		
			2	17.6	34.2	7.3	94.0			
			5	17.7	34.2	7.2	92.7			
			10	17.6	34.1	7.2	92.0			
			B-1	17.6	33.4	7.0	89.6			
大 曾 根 養 殖 場	10:20	28	0	17.8	34.2	7.9	102.2	7.0		
			2	17.8	34.2	7.5	97.1			
			5	17.8	34.3	7.1	91.4			
			10	18.0	34.4	6.7	86.4			
			B-1	18.2	34.5	6.3	82.1			
湾 中 央 部	9:22	34	0	18.0	34.3	7.5	97.0	9.0		
			2	18.0	34.3	7.1	92.6			
			5	18.0	34.4	7.0	91.3			
			10	18.0	34.4	7.0	90.8			
			B-1	18.2	34.6	6.0	78.2			
最 大 値				18.7	34.6	7.9	102.2	17.0		
最 小 値				17.6	33.4	6.0	78.2	7.0		

概 況

水温は17.6～18.7℃の範囲にあり、湾内の表層付近では概ね18.0℃前後の値となっていた。これは、過去30年間の2m層における平年値と比較すると-0.3℃～-0.5℃であり平年並みの値を示した。

塩分濃度は33.4～34.6psuの範囲であった。

溶存酸素量(DO)は6.0～7.9mg/lの範囲であった。

透明度は7.0m～17.0mの範囲であった。