

質問票調査の状況【補足】ver.3.0
 (男女別・年齢調整)

性別	生活習慣等	総数(40~74歳)														
		総人數				該当者割合				年齢調整割合				標準化比 vs.		
		地域	地域	同規模	県	全国	地域	同規模	県	全国 (基準)	同規模 (=100)	県 (=100)	全国 (=100)			
男性	服薬_高血圧症	466	42.5%	42.1%	42.6%	41.3%	40.8%	41.8%	41.4%	41.3%	98.4	99.6	99.5			
	服薬_糖尿病	466	11.8%	12.6%	12.2%	11.9%	11.7%	12.5%	11.9%	11.9%	91.6	96.1	96.3			
	服薬_脂質異常症	467	24.2%	21.2%	25.5%	22.5%	23.4%	21.0%	24.9%	22.5%	112.0	94.7	104.7			
	既往歴_脳卒中	465	8.0%	4.6%	5.5%	4.8%	7.8%	4.6%	5.4%	4.8%	*167.3	*144.7	*161.0			
	既往歴_心臓病	466	8.8%	8.3%	9.3%	8.4%	8.7%	8.3%	9.0%	8.4%	103.1	94.6	101.2			
	既往歴_慢性腎臓病・腎不全	466	1.7%	1.1%	1.2%	1.0%	1.6%	1.1%	1.2%	1.0%	156.7	143.8	162.1			
	既往歴_貧血	466	6.9%	4.3%	5.9%	5.1%	6.7%	4.3%	5.8%	5.1%	*156.0	115.8	132.3			
	喫煙	467	25.7%	23.7%	22.6%	22.7%	25.8%	23.7%	23.1%	22.7%	111.3	113.5	116.1			
	20歳時体重から10kg以上増加	465	42.6%	41.7%	42.4%	43.3%	43.8%	41.7%	42.8%	43.3%	103.0	100.2	98.8			
	1回30分以上の運動習慣なし	467	60.2%	60.3%	58.1%	56.4%	60.7%	60.3%	58.9%	56.4%	100.7	103.3	107.9			
	1日1時間以上運動なし	466	59.4%	46.9%	54.0%	47.4%	60.1%	46.7%	54.3%	47.4%	*127.1	109.7	*125.7			
	歩行速度遅い	464	51.9%	52.8%	53.3%	48.4%	52.2%	52.7%	53.5%	48.4%	98.8	97.5	107.5			
	1年間で体重増減3kg以上	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0			
	食べる速度が速い	466	33.9%	31.2%	32.3%	31.1%	35.0%	31.3%	32.8%	31.1%	110.2	105.0	110.8			
	食べる速度が普通	466	58.2%	60.0%	60.0%	60.8%	57.6%	59.9%	59.6%	60.8%	96.4	96.9	95.0			
	食べる速度が遅い	466	7.9%	8.8%	7.7%	8.1%	7.5%	8.8%	7.6%	8.1%	89.0	102.9	97.1			
	週3回以上就寝前夕食	466	16.3%	20.8%	16.9%	21.2%	17.2%	20.9%	17.6%	21.2%	79.9	97.1	79.6			
	週3回以上夕食後間食	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0			
	週3回以上朝食を抜く	463	10.2%	9.4%	8.8%	11.1%	10.5%	9.6%	9.5%	11.1%	114.3	117.5	99.6			
	毎日飲酒	466	37.3%	45.7%	39.9%	43.3%	36.5%	45.5%	39.5%	43.3%	*81.1	93.0	*85.2			
	時々飲酒	466	19.5%	22.3%	19.5%	23.5%	19.5%	22.4%	19.7%	23.5%	88.1	100.3	84.0			
	飲まない	466	43.1%	31.9%	40.6%	33.2%	43.9%	32.1%	40.8%	33.2%	*135.7	106.8	*131.1			
	1日飲酒量(1合未満)	442	59.7%	43.9%	57.9%	46.3%	60.2%	44.1%	57.7%	46.3%	*135.2	103.5	*129.1			
	1日飲酒量(1~2合)	442	23.8%	36.2%	29.1%	34.2%	22.8%	36.1%	28.8%	34.2%	*65.1	*81.1	*68.5			
	1日飲酒量(2~3合)	442	12.9%	15.6%	10.2%	15.2%	12.9%	15.5%	10.4%	15.2%	84.2	125.6	85.7			
	1日飲酒量(3合以上)	442	3.6%	4.3%	2.8%	4.3%	4.1%	4.3%	3.0%	4.3%	90.4	132.4	90.3			
	睡眠不足	464	14.9%	23.1%	18.7%	22.5%	15.3%	23.1%	18.9%	22.5%	*65.2	79.7	*67.4			
	改善意欲なし	465	33.3%	36.8%	34.9%	32.5%	33.1%	36.7%	34.5%	32.5%	90.0	95.8	101.6			
	改善意欲あり	465	28.4%	26.4%	25.8%	26.5%	29.1%	26.5%	26.2%	26.5%	108.7	110.2	109.0			
	改善意欲ありかつ始めている	465	13.8%	10.1%	12.9%	12.0%	13.8%	10.1%	13.1%	12.0%	*138.0	106.4	116.5			
	取り組み済み6ヶ月未満	465	8.4%	6.7%	6.8%	7.5%	8.2%	6.7%	6.8%	7.5%	126.1	123.9	113.1			
	取り組み済み6ヶ月以上	465	16.1%	20.0%	19.7%	21.6%	15.8%	20.0%	19.4%	21.6%	79.7	81.8	*73.6			
	保健指導利用しない	466	62.4%	64.9%	63.3%	61.9%	61.9%	64.9%	63.2%	61.9%	96.4	98.8	100.7			
	咀嚼_何でも	464	64.4%	76.2%	73.2%	77.7%	65.7%	76.4%	73.6%	77.7%	*84.9	*88.1	*83.3			
	咀嚼_かみにくい	464	32.3%	22.4%	25.4%	21.0%	31.3%	22.3%	25.0%	21.0%	*142.2	*127.2	*150.8			
	咀嚼_ほとんどかめない	464	3.2%	1.3%	1.4%	1.2%	3.0%	1.3%	1.4%	1.2%	*239.0	*226.1	*272.0			
	3食以外間食_毎日	462	14.9%	14.1%	13.6%	13.6%	15.2%	14.2%	13.8%	13.6%	107.0	110.0	112.0			
	3食以外間食_時々	462	57.4%	56.1%	56.3%	56.0%	57.5%	56.2%	56.3%	56.0%	102.0	101.9	102.4			
	3食以外間食_ほとんど摂取しない	462	27.7%	29.7%	30.1%	30.4%	27.3%	29.6%	29.9%	30.4%	92.9	92.0	90.5			

国保データベース(KDB)のCSVファイル(質問票調査の状況)より計算。

年齢調整(%)は全国受診者数(男女別)を基準人口とした直接法による。従って、厳密な男女比較はできない。受診者が少ない地域では、年齢調整(%)がエラーまたは異常な値となることがあるため、標準化比で評価することが望ましい。標準化比は同規模、県、または全国を基準とした間接法による。標準化比に*が付記されたものは、基準に比べて有意な差($p<0.05$)があること意味する。

Ver. 3.0 (2019.3.29) 平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(政策科学推進研究事業)「都道府県医療費適正化計画推進のための健診・医療等の情報活用を担う地域の保健医療人材の育成に関する研究」(研究代表:横山徹爾)

質問票調査の状況【補足】ver.3.0
 (男女別・年齢調整)

性別	生活習慣等	総数(40~74歳)											
		該当者割合				年齢調整割合				標準化比 vs.			
		総人數	地域	同規模	県	全国	地域	同規模	県	全国 (基準)	同規模 (=100)	県 (=100)	全国 (=100)
女性	服薬_高血圧症	773	35.8%	83.2%	33.8%	31.2%	34.4%	33.0%	32.9%	31.2%	103.2	103.5	109.0
	服薬_糖尿病	773	5.8%	6.7%	6.6%	6.0%	5.5%	6.7%	6.4%	6.0%	83.7	86.6	92.2
	服薬_脂質異常症	773	33.9%	30.3%	32.6%	29.7%	32.4%	30.0%	31.7%	29.7%	107.6	102.0	108.8
	既往歴_脳卒中	772	4.1%	2.3%	2.6%	2.3%	4.0%	2.3%	2.5%	2.3%	*170.4	*158.1	*169.0
	既往歴_心臓病	772	3.8%	4.1%	4.1%	4.0%	3.5%	4.1%	4.0%	4.0%	86.3	89.5	90.1
	既往歴_慢性腎臓病・腎不全	772	0.3%	0.7%	0.6%	0.6%	0.3%	0.7%	0.6%	0.6%	38.3	40.4	44.0
	既往歴_貧血	771	15.3%	14.2%	15.2%	15.0%	16.5%	14.3%	15.7%	15.0%	111.8	102.6	107.4
	喫煙	773	6.1%	4.6%	4.5%	5.8%	6.6%	4.7%	4.8%	5.8%	*143.5	*140.3	114.7
	20歳時体重から10kg以上増加	770	28.4%	27.4%	26.1%	26.9%	28.9%	27.5%	26.2%	26.9%	104.1	109.2	106.3
	1回30分以上の運動習慣なし	771	68.4%	64.8%	64.4%	60.5%	69.5%	64.9%	65.0%	60.5%	107.2	107.0	*115.3
	1日1時間以上運動なし	770	61.3%	47.4%	56.0%	47.0%	62.2%	47.3%	56.2%	47.0%	*130.4	*109.9	*131.5
	歩行速度遅い	767	54.9%	54.9%	57.8%	49.6%	55.6%	55.0%	58.1%	49.6%	100.7	95.4	*111.7
	1年間で体重増減3kg以上	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0
	食べる速度が速い	771	25.2%	24.9%	23.7%	24.2%	25.5%	24.9%	23.9%	24.2%	102.0	106.6	105.1
	食べる速度が普通	771	66.9%	66.2%	68.6%	67.6%	66.7%	66.1%	68.4%	67.6%	100.8	97.4	98.5
	食べる速度が遅い	771	7.9%	8.9%	7.7%	8.2%	7.8%	9.0%	7.8%	8.2%	88.5	103.3	97.6
	週3回以上就寝前夕食	770	7.8%	11.1%	8.8%	11.4%	8.3%	11.3%	9.1%	11.4%	*71.2	90.4	*71.2
	週3回以上夕食後間食	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0	0.0
	週3回以上朝食を抜く	771	4.5%	5.3%	4.9%	6.8%	4.9%	5.4%	5.2%	6.8%	92.3	97.9	73.9
	毎日飲酒	773	8.0%	8.8%	7.8%	11.0%	8.4%	8.8%	8.0%	11.0%	95.0	104.5	*75.8
	時々飲酒	773	17.6%	19.5%	15.9%	21.8%	17.5%	19.5%	16.1%	21.8%	92.1	111.6	*82.3
	飲まない	773	74.4%	71.8%	76.2%	67.2%	74.1%	71.7%	75.8%	67.2%	102.7	97.2	*109.3
	1日飲酒量(1合未満)	700	91.3%	86.5%	91.7%	83.8%	90.8%	86.3%	91.1%	83.8%	104.4	99.1	107.5
	1日飲酒量(1~2合)	700	6.6%	10.7%	6.4%	12.6%	6.8%	10.7%	6.7%	12.6%	*65.5	106.1	*55.1
	1日飲酒量(2~3合)	700	1.4%	2.2%	1.4%	2.8%	1.6%	2.3%	1.5%	2.8%	71.7	111.0	57.4
	1日飲酒量(3合以上)	700	0.7%	0.6%	0.5%	0.8%	0.8%	0.6%	0.6%	0.8%	139.5	165.4	112.5
	睡眠不足	769	18.5%	27.1%	21.6%	27.1%	18.6%	27.2%	21.8%	27.1%	*68.9	85.6	*69.2
	改善意欲なし	769	23.5%	26.5%	27.8%	25.4%	23.0%	26.5%	27.6%	25.4%	87.4	*83.7	90.8
	改善意欲あり	769	32.1%	29.6%	28.4%	29.1%	32.1%	29.7%	28.8%	29.1%	110.6	*114.2	113.0
	改善意欲ありかつ始めている	769	17.4%	12.9%	15.2%	14.7%	17.6%	13.0%	15.3%	14.7%	*136.6	115.4	*121.1
	取り組み済み6ヶ月未満	769	8.3%	8.7%	7.7%	9.0%	8.7%	8.7%	7.7%	9.0%	97.0	109.2	93.7
	取り組み済み6ヶ月以上	769	18.6%	22.3%	20.9%	21.9%	18.7%	22.1%	20.6%	21.9%	*82.0	88.4	*83.1
	保健指導利用しない	770	57.8%	61.3%	59.3%	58.6%	58.3%	61.5%	59.3%	58.6%	94.4	97.4	98.5
	咀嚼_何でも	768	72.5%	79.8%	78.7%	81.3%	72.9%	79.9%	79.0%	81.3%	*91.3	92.4	*89.7
	咀嚼_かみにくい	768	27.0%	19.6%	20.8%	18.2%	26.6%	19.5%	20.5%	18.2%	*135.1	*128.5	*145.2
	咀嚼_ほとんどかめない	768	0.5%	0.6%	0.5%	0.5%	0.5%	0.6%	0.5%	0.5%	83.9	103.4	98.3
	3食以外間食_毎日	769	26.0%	26.7%	25.8%	25.7%	26.1%	26.7%	26.0%	25.7%	98.7	101.5	102.7
	3食以外間食_時々	769	57.2%	58.9%	58.6%	59.1%	57.0%	58.8%	58.4%	59.1%	96.8	97.4	96.4
	3食以外間食_ほとんど摂取しない	769	16.8%	14.4%	15.6%	15.2%	16.8%	14.4%	15.6%	15.2%	115.2	107.2	109.5

国保データベース(KDB)のCSVファイル(質問票調査の状況)より計算。

年齢調整(%)は全国受診者数(男女別)を基準人口とした直接法による。従って、厳密な男女比較はできない。受診者が少ない地域では、年齢調整(%)がエラーまたは異常な値となることがあるため、標準化比で評価することが望ましい。
 標準化比は同規模、県、または全国を基準とした間接法による。標準化比に*が付記されたものは、基準に比べて有意な差($p<0.05$)があること意味する。

Ver. 3.0 (2019.3.29) 平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(政策科学推進研究事業)「都道府県医療費適正化計画推進のための健診・医療等の情報活用を担う地域の保健医療人材の育成に関する研究」(研究代表:横山徹爾)